



《晋中市生活垃圾分类管理条例》

主要内容

条例共六章三十三条,主要包括总则、分类投放、分类收集、运输与处理、保障与监督、法律责任、附则,主要规定了以下几方面内容:

3 条例规定了城市和农村垃圾收运模式,规范收运作业流程,明确各类垃圾处理方式。

●规定城市由环境卫生主管部门组织相关单位分类收运处理,农村实行村收集、乡镇转运或县直运、区域处理。

●规定了收运单位的操作规范和处理单位的义务。

●明确了四类垃圾处理方式。



●建立“谁产生谁付费”的垃圾处理收费制度,由政府制定标准,逐步实现差别化管理。

4 条例规范了多项保障与监督机制。

●建立考核评价制度,对垃圾分类工作进行考核。

●建立监督检查机制,对管理责任人和收运处理单位开展监督检查。

●搭建智能化监管平台,实现信息共享,提升管理效率。

●建立执法联动机制,及时查处违法行为。

●畅通投诉举报渠道,鼓励公众参与监督。

●支持科技创新,鼓励社会力量通过投资、捐赠等方式参与、运营垃圾分类工作。

5 条例明确了相关法律责任。

●对已实行生活垃圾分类管理的区域,未在指定投放点分类投放垃圾的单位和个人,责令改正,情节严重的分别处以罚款。

●对管理责任人未按规定设置投放点或收集容器的,责令限期改正,逾期不改则罚款。



阳光曝晒 谨防日光性皮炎

夏天紫外线逐渐增强,不少人发现晒过太阳后,脸部会出现发红、发痒的症状。中南大学湘雅三医院皮肤科主任鲁建云说,这可能是日光性皮炎。日光性皮炎又称急性日晒伤,是正常皮肤接受过量强烈紫外线照射后产生的一种急性炎症反应。

鲁建云介绍,常见的日光性皮炎患者皮疹通常位于暴露部位,如面、颈、手背等。在曝晒后数小时至数天内,患者皮肤开始出现边界清晰的红斑,严重者可发展为水疱、大疱,伴灼痛、瘙痒或刺痛感。红斑通常在 24 至 48 小时达到高峰,随后逐渐脱屑、色素沉着。

“日光性皮炎不仅影响生活质量,长期反复发病还可能增加皮肤癌风险。通过科学防晒和及时干预,可有效降低紫外线对

空调尘螨导致过敏性鼻炎

盛夏时节,从酷热的室外钻进凉爽的空调房,经常有人不自觉地频繁打喷嚏、流鼻涕,眼睛又红又痒,甚至浑身起红疹。这是个体对冷空气过敏吗?不,罪魁祸首是螨虫引发了过敏性鼻炎。

中南大学湘雅医院耳鼻咽喉头颈外科主任蒋卫红解释,尘螨喜潮湿(湿度 80% 左右)、温暖(温度 17℃ 至 30℃)的环境,它们以人类的皮屑、汗液、毛发等为食,其分泌物、排泄物、死亡虫体和蜕皮等都是过敏原,可通过空气或接触进入人体,引起过敏反应。

空调启动时,关紧的门窗使得室内空间相对密闭、通风不畅,尘螨以及它们的排泄物、尸体碎片等随冷风散布整个房间。中南大学湘雅三医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师马艳红说,当这些东西被人体吸入鼻腔后,就会激发人体免疫系统释放出组胺等“化学武器”,导致人出现过敏症状。

如何科学预防螨虫引起的过

敏性鼻炎?专家表示,要从生活细节入手。比如,螨虫克星是“高温+曝晒”,可每隔一至两周,对家中凉席、空调被、枕套、床单等进行 55℃ 以上的水浸泡;新凉席或闲置后启用的被褥,也可先用热水烫洗再放置于太阳下曝晒,晒完用手多拍打;定期使用除螨仪深度清洁床垫、沙发;将空调调节为除湿模式,使室内湿度保持在 50% 以下;每天早、晚至少开窗通风 2 次,每次 30 分钟以上。

此外,专家建议,每隔 1 至 2 个月清洗一次空调滤网,开启空调前先打开门窗,空调开启数分钟后,再关闭门窗;卧室尽量不堆放过多毛绒玩具、厚窗帘等易积灰藏螨的物体;经常擦拭家具表面,减少扬尘,并对沙发、地毯每周至少吸尘一次;可给枕头、床垫、被子套上防螨面料的罩子,隔离过敏原。

炎炎夏日,让人难受的不只是高温酷暑,还有不少与之相关的过敏性疾病。在世界过敏性疾病日到来之际,科技日报记者走访多位医院专家,让他们为解决夏日的敏感烦恼支招。

夏日三大过敏“元凶” 伤身扰人

□ 俞慧友

蚊虫叮咬引发丘疹性荨麻疹

夏季,被蚊虫叮咬后,不少人的皮肤上会出现连片的风团样丘疹,奇痒难耐。鲁建云表示,这很有可能是丘疹性荨麻疹在作祟。

不同于普通蚊包,丘疹性荨麻疹源于免疫系统的过激反应。鲁建云介绍,丘疹性荨麻疹又称为“虫咬皮炎”,是昆虫叮咬所致的一种过敏反应,以鲜红色风团样丘疹伴瘙痒为主要表征。

她介绍,丘疹性荨麻疹出现之初为皮色或红色的风团样丘疹。当炎症扩散至周围组织,则可能诱发风团样改变,形成粉红或苍白色的“周边风团”,并伴有剧烈瘙痒。随着人们不断搔抓,可导致风团扩大、水肿及瘙痒加剧,甚至生成水疱,引发继发感染或遗留色素沉着、瘢痕。

出现丘疹性荨麻疹时,专家建议,首选要避免搔抓,然后进行局部冷敷,并选择炉甘石洗剂外用,但要避免涂抹在破溃处。若患者红肿瘙痒剧烈,可在医师指导下,在皮损未破溃处外用糖皮质激素

药膏,快速抑制炎症反应。瘙痒剧烈或皮损广泛者,可系统使用抗组胺药物缓解症状。

鲁建云特别提示,虽然多数丘疹性荨麻疹可自行缓解或经上述处理好转,但若出现皮损累及面部且不消退,瘙痒的同时合并心慌、胸闷、发热等系统症状,局部皮损继发感染,皮疹迁延且进行性加重等情况,就应立即就医。

丘疹性荨麻疹也有预防之道。专家表示,户外活动时建议穿着浅色、致密长袖衣裤;居室安装纱窗纱门,睡眠时使用蚊帐;遵循产品说明,正确使用含有效驱蚊成分(如避蚊胺、驱蚊酯等)的驱蚊剂;保持室内外环境清洁干燥;既往有严重虫咬反应史或过敏体质者,外出应加强防护,家中可常备抗组胺药物。(新华网)

皮肤的损伤。”中南大学湘雅医院皮肤科主任栗娟说。

一是可以采用物理防护。专家建议,白天出行选择使用紫外线防护系数大于 50 的防晒衣、防晒伞、宽边帽和太阳镜。二是可以采用化学防护。专家建议日常可选择涂抹紫外线防护系数 30 以上、PA+++ 以上的防晒霜,并在出门前 15 至 30 分钟涂抹,确保防晒霜有足够时间成膜。此外,建议每 2 小时补涂一次,特别是在出汗或游泳后。三是要做好生活调整。专家建议,易感人群减少光敏性食物,如芹菜、香菜、木耳等的摄入;对光敏性药物敏感者,则需咨询医生调整用药方案。

“特别要提醒的是,即便阴天也需要做好紫外线防护。”中南大学湘雅医院皮肤科主治医师罗钟玲说,阴天云层较厚,虽然能阻断部分中波紫外线,但长波紫外线依然能穿透云层到达地面。长波紫外线是导致黑化、松弛、产生皱纹等皮肤光老化现象的“元凶”,因此,阴天更不能放松警惕。

此外,栗娟提醒,若出现严重皮疹或症状持续不缓解,建议及时就医,并接受规范治疗。